

España

Published on Syngenta (<http://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Chirivia bombardera





Chirivia bombardera

PAVSU

Pastinaca sativa subsp. *urens* (Req. ex Godr.) Celak.

Dicotiledóneas perennes

Familia

Apiaceae

Synonyme:

Chirivia bombardera

Nocividad



++

Joven

Grandes cotiledones elípticos, alargados, largos peciolo, nervadura mediana visible. Primeras hojas redondeadas, cordiformes, crenadas, peciolo velludo.

Adulto

Hojas: pubescentes, divididas en grandes fragmentos (3 a partir de la 3ra hoja y luego 5 a 7). Folíolo terminal a menudo trilobulado y redondeado. Vaina poco desarrollada, apretada alrededor del peciolo. Tallo hendido, pubescente, base simplemente estriada, no acanalada. Inflorescencias: grandes tallos floríferos (hasta 2 m). Umbelas bastante homogéneas, umbélulas sin involucre de brácteas en la base, flores amarillas. Tamaño máximo de los rayos: 4 cm. Frutos: diaquenios aplanados en forma de lente, presencia de nervios en bandas pardas.

Particularidades

Ruderal, todos los cultivos. Olor (hojas, raíces). Reacciones dérmicas al contacto de la planta, cuyos órganos contienen cumarina: enrojecimientos, ampollas y oscurecimientos (fotosensibilización).
