

Listego



Listego

Última actualización:
28.08.2018

Herbicida

Protección de cultivos

Número de autorización:

25799

Formato:

5 l

Composición:

4% p/v (40 g/l)

Imazamox

Formulación:

Concentrado soluble (SL)

Utilizar sólo en las variedades de girasol Clearfield®. El uso de Listego® sobre variedades de girasol no Clearfield® supondrá daños irreparables sobre el cultivo.

Para el control de jopo, dicotiledóneas y gramíneas. Interfiere con el crecimiento celular de las plantas.

Product CP: Tabs

- [Registros](#)
- [Clasificación y seguridad](#)

Registros

Filtrar por Cultivo

- Todos - ▼

Aplicar

Girasol

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	ESPECIE	DOSIS
Girasol Clearfield®	Pulverización normal o pulverizador arrastrado con boquillas hidráulicas	Malas hierbas	Max. 1,25 l/ha con el girasol entre 2 y 4 hojas y las hierbas adventicias desde el estadio de "cotiledones" hasta las 4-6 hojas de las dicotiledóneas y de 1 hoja hasta comienzo de encañado en el caso de gramíneas.
	(1 aplicación por campaña)	Jopo (<i>Orobanche cernua</i>)	Max 1,25 l/ha aplicados en postemergencia con el girasol de 4 a 8 pares de hojas y coincidiendo con la instalación del jopo en el sistema radicular.

Aplicar a una dosis máxima de 1,25 l/ha, recomendado en mezcla con un adyuvante (dosis inferior a 0,625 l/ha)

Utilizar sólo en las variedades de girasol Clearfield®. El uso de Listego® sobre variedades de girasol no Clearfield® supondrá daños irreparables sobre el cultivo.

En los días siguientes a la aplicación del herbicida, el cultivo de girasol Clearfield® puede manifestar amarilleo y/o una reducción de altura. Los fenómenos de amarilleo, a veces intensos, no son sistemáticos y son de carácter pasajero (1 a 2 semanas). La compactación de la vegetación, cuando se manifiesta, puede observarse hasta el final de la temporada. Todas estas manifestaciones no inciden sobre el rendimiento.

Recomendaciones generales para el cultivo siguiente: A continuación del cultivo tratado con Listego®, no podrán sembrarse ni remolacha ni colza ni otras crucíferas. Respetar un plazo de 4 meses desde la aplicación hasta la siembra de trigo, cebada, avena, garbanzos, girasol (variedades no Clearfield®) y tabaco y de 9 meses para la siembra de maíz, algodón, patatas y arroz (variedades no Clearfield®).

Para evitar la aparición de resistencias en malas hierbas en general, se recomienda no utilizar herbicidas con el mismo modo de acción durante la misma campaña.

Con el fin de proteger las aguas subterráneas no aplicar en suelos de textura arenosa.

Clasificación y seguridad

Clasificación, Etiquetado y Empaquetado (CLP)

•
SGH09

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- "Evitar respirar la niebla.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Llevar guantes y prendas de protección.
- Evitar su liberación al medio ambiente
- Recoger el vertido
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- Primeros auxilios
- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas
- En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, y las rodillas semiflexionadas
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase
- **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO**
- La intoxicación puede provocar
- Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.
- Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario
- Tratamiento sintomático.
- **EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.** Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Indicaciones preventivas

Equipo de protección personal

- En todos los usos autorizados, durante la mezcla/carga, aplicación, manejo y limpieza del equipo, se deberá utilizar guantes de protección química como mínima medida de protección individual.
 - Vestir ropa de protección adecuada y protección facial y ocular durante la mezcla/carga y la aplicación.
 - Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir de equipo de protección siempre que se mantengan las ventanas cerradas.
 - No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
-