

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Chirivia bombardera

---







Chirivia bombardera

# PAVSU

*Pastinaca sativa* subsp. *urens* (Req. ex Godr.) Celak.

## Dicotiledóneas perennes

### Familia

Apiaceae

#### Synonyme:

*Chirivia bombardera*

Nocividad



++

### Joven

Grandes cotiledones elípticos, alargados, largos peciolo, nervadura mediana visible. Primeras hojas redondeadas, cordiformes, crenadas, peciolo velludo.

### Adulto

Hojas: pubescentes, divididas en grandes fragmentos (3 a partir de la 3ra hoja y luego 5 a 7). Folíolo terminal a menudo trilobulado y redondeado. Vaina poco desarrollada, apretada alrededor del peciolo. Tallo hendido, pubescente, base simplemente estriada, no acanalada. Inflorescencias: grandes tallos floríferos (hasta 2 m). Umbelas bastante homogéneas, umbélulas sin involucre de brácteas en la base, flores amarillas. Tamaño máximo de los rayos: 4 cm. Frutos: diaquenios aplanados en forma de lente, presencia de nervios en bandas pardas.

## Particularidades

Ruderal, todos los cultivos. Olor (hojas, raíces). Reacciones dérmicas al contacto de la planta, cuyos órganos contienen cumarina: enrojecimientos, ampollas y oscurecimientos (fotosensibilización).

---