

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Auros

---

## Auros



## Auros

Última actualización:

18.09.2020

## Herbicida

### Protección de cultivos

**Número de autorización:**

18087

**Formato:**

5 l

**Composición:**

80 % p/v

Prosulfocarb.

**Formulación:**

Concentrado emulsionable (EC)

Tratamientos herbicidas de pre-emergencia o post-emergencia temprana en los cultivos de trigo y cebada de invierno, patata, guisantes y judías para grano, para control de Gramíneas anuales: *Alopecurus myosuroides* (Cola de zorra), *Apera spica venti*, *Lolium multiflorum* (Vallico), *Poa annua* (Pelosa). Y Dicotiledóneas anuales: *Anthemis arvensis* (Manzanilla salvaje), *Atriplex patula* (Armuelle), *Chenopodium album* (Cenizo), *Fumaria officinalis* (Conejito), *Galium aparine* (Amor del hortelano), *Lamium amplexicaule* (Ortiga muerta), *Portulaca oleracea* (Verdolada), *Senecio vulgaris* (Hierba cana), *Solanum nigrum* (Tomatito), *Sonchus oleraceus* (Cerraja), *Stellaria media* (Pamplina), *Urtica urens* (Ortiga), *Verónica spp.* (Verónica).

## Product CP: Tabs

- [Registros](#)

## Clasificación y seguridad

- [Medio ambiente](#)
- [En caso de emergencia](#)
- [Datos sobre LMRs](#)

## Registros

Patata

**Gramíneas anuales:** *Alopecurus myosuroides* (Cola de zorra), *Apera spica venti*, *Lolium multiflorum* (Vallico), *Poa annua* (Pelosa). **Dicotiledóneas anuales:** *Anthemis arvensis* (Manzanilla salvaje), *Atriplex patula* (Armuelle), *Chenopodium album* (Cenizo), *Fumaria officinalis* (Conejito), *Galium aparine* (Amor del hortelano), *Lamiun amplexicaule* (Ortiga muerta), *Portulaca oleracéa* (Verdolada), *Senecio vulgaris* (Hierba cana), *Solanum nigrum* (Tomatito), *Sonchus oleraceus* (Cerraja), *Stellaria media* (Pamplina), *Urtica urens* (Ortiga), *Verónica spp.* (Verónica).

Dosis	Volumen de agua	Aplicación	Plazo de seguridad	Comentario
3-5 l/ha	100-400 l/ha	Número de aplicaciones: 1 Aplicar desde la pre-emergencia de la patata hasta que la primera hoja del tallo principal esté desplegada; el momento óptimo de aplicación es unos días antes del nacimiento de los tubérculos. AUROS puede ser aplicado en pulverización normal con tractor con cabina cerrada, con un gasto de caldo de 100 hasta 400 l/Ha.	No procede	

•