

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Dividend Formula M

Dividend Formula M



Dividend Formula M

Última actualización:

04.05.2018

Tratamiento de semillas

Protección de cultivos

Número de autorización:

22008

Formato:

20 l

200 l

1.000 l

Composición:

3% p/v (30 g/l)

Difenoconazol

Formulación:

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Fungicida sistémico de amplio espectro indicado para el control de las enfermedades del suelo y la semilla en el cultivo del cereal. Su acción de contacto y sistémica combate enfermedades localizadas tanto en el exterior como dentro de la simiente. Evita infecciones foliares en estadios tempranos, de forma segura para la semilla.

Product CP: Tabs

- [Registros](#)
- [Clasificación y seguridad](#)

Sugerencia de aplicación

- En caso de emergencia

- Other

Filtrar por Cultivo

- Todos - ▼

Aplicar

Cebada

Plaga	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Helminthosporiosis	Aplicar homogéneamente con maquinaria adecuada que impregne uniformemente toda la semilla. Para ello puede utilizarse el producto directamente o diluido en 400-500 ml de agua por cada 100 kg de semilla.	100-200 ml por 100 kg de semilla, en función de la presión de la enfermedad

Los envases o sacos conteniendo semilla tratada con DIVIDEND FORMULA M deberán llevar impreso o rotulado el siguiente aviso: "Semilla tratada con Difenconazol. Inhabilitada para el consumo. Destinarla exclusivamente para siembra. No reutilizar el envase vacío".

Trigo

Plaga	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Caries y podredumbres de cuello y raíz	Aplicar homogéneamente con maquinaria adecuada que impregne uniformemente toda la semilla. Para ello puede utilizarse el producto directamente o diluido en 400-500 ml de agua por cada 100 kg de semilla.	100 ml por 100 kg de semilla
Carbón vestido		200 ml por 100 kg de semilla

Los envases o sacos conteniendo semilla tratada con DIVIDEND FORMULA M deberán llevar impreso o rotulado el siguiente aviso: "Semilla tratada con Difenconazol. Inhabilitada para el consumo. Destinarla exclusivamente para siembra. No reutilizar el envase vacío".

•

Indicaciones preventivas

- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar los vapores ni los aerosoles.
- Evítese el contacto con la piel.
- Utilizar guantes adecuados.
- EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrela la etiqueta)
- Primeros auxilios
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
- Realizar tratamiento sintomático.
- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Telf: (91) 562 04 20

Otras restricciones de uso

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Mezcla y aplicación

Aplicar homogéneamente con maquinaria adecuada que impregne uniformemente toda la semilla. Para ello puede utilizarse el producto directamente o diluido en 400-500 ml de agua por cada 100 kg de semilla.

- EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrela la etiqueta)

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Telf: (91) 562 04 20

CULTIVO	PLAZO DE SEGURIDAD	LMR
Trigo	NP	0,1 mg/kg
Cebada	NP	0,05* mg/kg

- NP: No procede.
 - * Límite de determinación analítica

"Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm"
