

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Dual Gold

---

## Dual Gold



## Dual Gold

Última actualización:

28.08.2018

## Herbicida

### Protección de cultivos

**Número de autorización:**

22126

**Formato:**

1 l

5 l

**Composición:**

96% p/v

S-metolacloro

**Formulación:**

Concentrado emulsionable (EC)

Herbicida para su uso en los cultivos de girasol, patata, maíz y remolacha particularmente indicado para el control de gramíneas anuales en pre o post emergencia precoz de las malas hierbas. Penetra en las plántulas en germinación, cuando atraviesan la capa de suelo que contiene el herbicida, inhibiendo su desarrollo.

## Product CP: Tabs

- [Registros](#)
- [Clasificación y seguridad](#)
- [Sugerencia de aplicación](#)

- [En caso de emergencia](#)

- [Other](#)

Filtrar por Cultivo

- Todos - ▼

Aplicar

### Algodón

Plaga	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Gramíneas anuales	Pulverización normal	<b>1 a 1,3 l/ha.</b> se aplicará en pre-emergencia (brevemente después de la siembra). La dosis más baja se aplicará en pre-emergencia precoz con incorporación leve (3-5 cm)

### Girasol

Plaga	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Gramíneas anuales	Pulverización normal	<b>0,5 a 1,6 l/ha.</b> se aplicará en pre-emergencia ó post-emergencia precoz del cultivo. La dosis más elevada se empleará en suelos fuertes o donde se espere fuerte infestación de gramíneas. La dosis de 1,6 l/ha se reservará para suelos con elevado contenido en materia orgánica (4%)

### Maíz

Plaga	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Gramíneas anuales	Pulverización normal	<b>0,5 a 1,6 l/ha.</b> se aplicará en pre-emergencia del cultivo. La dosis de 1,6 l/ha se reservará para suelos con elevado contenido en materia orgánica (4%), en suelos fuertes o donde se espere fuerte infestación de gramíneas.

### Patata

Plaga	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Gramíneas anuales	Pulverización normal	<b>0,5 a 1,5 l/ha</b> se aplicará en pre-emergencia o post-emergencia precoz del cultivo. La dosis de 1,5 l/ha se reservará para suelos con elevado contenido en materia orgánica (4%)

### Remolacha azucarera

Plaga	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Gramíneas anuales	Pulverización normal	0,5 a 1,5 l/ha se aplicará en pre-emergencia o post-emergencia precoz del cultivo. La dosis de 1,5 l/ha se reservará para suelos con elevado contenido en materia orgánica (4%) o donde se espere fuerte infestación de gramíneas.

### Tabaco

Plaga	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Gramíneas anuales	Pulverización normal	<b>1 a 1,3 l/ha</b> antes del trasplante del tabaco

### Tomate

Plaga	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Gramíneas anuales	Pulverización normal	<b>1 a 1,3 l/ha</b> antes del trasplante del tomate

### Clasificación, Etiquetado y Empaquetado (CLP)



**GHS07**



**GHS09**

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel
- Provoca irritación ocular grave
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
- Evitar respirar la niebla.
- Llevar guantes y prendas de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua.
- Durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
- Primeros auxilios
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial.
- Realizar tratamiento sintomático.
- La intoxicación puede provocar: Dermatitis de contacto y sensibilización.
- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
- EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

## Indicaciones preventivas

## Equipo de protección personal

- La aplicación se realizará mediante tractor, debiendo utilizar el aplicador guantes de protección química adecuados durante las operaciones de mezcla/carga y aplicación así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas.
- No realizar actividades que impliquen contacto con el área o el cultivo tratado hasta que el producto depositado esté seco y al menos 24 horas después de la aplicación.
- Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

## Otras restricciones de uso

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.  
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

## Mezcla y aplicación

La cantidad de DUAL GOLD necesaria, según la dosis recomendada y la superficie a tratar, se disolverá en la cantidad de agua adecuada para un correcto reparto del herbicida, pudiendo oscilar entre 150 y 600 litros por hectárea.

Si se desea efectuar algún tipo de mezcla: consúltese con el Servicio Técnico de Syngenta.

Una vez preparado el caldo herbicida, se aplica mediante un aparato pulverizador, accionado a baja presión y provisto de agitador que debe estar en funcionamiento durante la preparación del caldo y su aplicación.

- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

<b>CULTIVO</b>	<b>PLAZO DE SEGURIDAD</b>	<b>LMR</b>
Patata	NP	0,05* mg/kg
Remolacha	NP	0,05* mg/kg
Girasol (semillas)	NP	0,1* mg/kg
Maíz	NP	0,05* mg/kg
Algodón	NP	0,05* mg/kg
Tomate	NP	0,05* mg/kg
Tabaco	NP	-

- NP: No procede.  
\* Límite de determinación analítica.

*"Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE:*

*[http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/index.cfm](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm)"*

---