

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Ridomil Gold MZ Pepite

Ridomil Gold MZ Pepite



Ridomil Gold MZ Pepite

Última actualización:

19.02.2019

Fungicida

Protección de cultivos

Número de autorización:

24.294

Formato:

1 Kg

5 Kg

Composición:

64% p/p

Mancozeb

3.9%p/p

Metalaxyl-M

Formulación:

Granulado dispersable en agua (WG)

RIDOMIL Gold MZ PEPITE es un *fungicida sistémico y de contacto*, **especialmente indicado para combatir el mildiu.**

La formulación de RIDOMIL Gold MZ PEPITE está especialmente estudiada para *conseguir una alta y duradera eficacia.*

La sustancia activa Metalaxil-M actúa de forma sistémica. Su absorción es rápida; en unos 30 minutos penetra en el interior de la planta por las partes verdes, se distribuye a través de la savia hacia los órganos en crecimiento, y **protege los nuevos desarrollos del cultivo.** Esta característica permite evitar problemas de arrastre o lavado en caso de producirse lluvias posteriores al tratamiento.

La sustancia activa Mancozeb **actúa por contacto, de forma preventiva.**

La combinación de las dos sustancias activas, **proporciona a RIDOMIL Gold MZ PEPITE dos formas de acción diferentes contra el mildiu.**

Product CP: Tabs

- [Registros](#)
- [Clasificación y seguridad](#)
- [Sugerencia de aplicación](#)
- [Medio ambiente](#)
- [En caso de emergencia](#)
- [Datos sobre LMRs](#)

Registros

Cebolla, Lechuga

Mildiu

Dosis	Volumen de agua	Aplicación	Plazo de seguridad	Comentario
0,20 - 0,25 %	-	<p>Ámbito de utilización: Aire libre</p> <p>Aplicar un máximo de 2.5 kg/ha</p> <p>Nº aplicaciones: 3 aplicaciones (intervalo 10-14 días)</p>	28 días	<p>Aplicar en pulverización foliar normal mojando uniformemente la parte aérea del cultivo con un máximo de 2.5 kg/ha, solo en cultivos al aire libre y mediante pulverización con instalación fija automatizada desde el exterior en invernadero. Contra mildiu los tratamientos deberán iniciarse al comienzo del periodo de crecimiento, de forma preventiva, antes del establecimiento de la enfermedad. Para ello se pueden seguir las recomendaciones de las Estaciones de Avisos. El intervalo máximo entre las aplicaciones será de 14 días. En condiciones muy favorables al desarrollo del mildiu, reducir el intervalo a 10 días, especialmente en las fases de mayor crecimiento del cultivo. Si fuera necesario realizar tratamientos adicionales, se utilizarán formulados autorizados con diferente modo de acción. El intervalo entre la última aplicación de RIDOMIL Gold MZ PEPITE y la del fungicida alternativo será el indicado en la etiqueta de este último, y no deberá ser superior a 10 días.</p>

Pepino

Mildiu

Dosis	Volumen de agua	Aplicación	Plazo de seguridad	Comentario
0.20 - 0.25 %	Ver aplicación.	<p>Ámbito de utilización: Aire libre e invernadero</p> <p>Nº Aplicaciones: 3 aplicaciones (intervalo: 10-14 días)</p> <p>Al aire libre aplicar un máximo de 2.5 kg/ha. En invernadero emplear una dosis máxima de 2.5 kg/ha y un volumen de 1000 l/ha.</p>	14 días	<p>Aplicar en pulverización foliar normal mojando uniformemente la parte aérea del cultivo con un máximo de 2.5 kg/ha, solo en cultivos al aire libre y mediante pulverización con instalación fija automatizada desde el exterior en invernadero. Contra mildiu los tratamientos deberán iniciarse al comienzo del periodo de crecimiento, de forma preventiva, antes del establecimiento de la enfermedad. Para ello se pueden seguir las recomendaciones de las Estaciones de Avisos. El intervalo máximo entre las aplicaciones será de 14 días. En condiciones muy favorables al desarrollo del mildiu, reducir el intervalo a 10 días, especialmente en las fases de mayor crecimiento del cultivo. Si fuera necesario realizar tratamientos adicionales, se utilizarán formulados autorizados con diferente modo de acción. El intervalo entre la última aplicación de RIDOMIL Gold MZ PEPITE y la del fungicida alternativo será el indicado en la etiqueta de este último, y no deberá ser superior a 10 días.</p>

Viña

Mildiu

Dosis	Volumen de agua	Aplicación	Plazo de seguridad	Comentario
0.20 - 0.25 %	-	<p>Ámbito de utilización: Aire libre</p> <p>Nº aplicaciones: 4 aplicaciones (intervalo 10-14 días)</p> <p>Aplicar un máximo de 2.5 kg/ha. El último tratamiento se dará como muy tarde 14 días después de floración</p>	15 días	<p>Aplicar en pulverización foliar normal mojando uniformemente la parte aérea del cultivo con un máximo de 2.5 kg/ha, solo en cultivos al aire libre y mediante pulverización con instalación fija automatizada desde el exterior en invernadero. Contra mildiu los tratamientos deberán iniciarse al comienzo del periodo de crecimiento, de forma preventiva, antes del establecimiento de la enfermedad. Para ello se pueden seguir las recomendaciones de las Estaciones de Avisos. El intervalo máximo entre las aplicaciones será de 14 días. En condiciones muy favorables al desarrollo del mildiu, reducir el intervalo a 10 días, especialmente en las fases de mayor crecimiento del cultivo. Si fuera necesario realizar tratamientos adicionales, se utilizarán formulados autorizados con diferente modo de acción. El intervalo entre la última aplicación de RIDOMIL Gold MZ PEPITE y la del fungicida alternativo será el indicado en la etiqueta de este último, y no deberá ser superior a 10 días.</p>

Clasificación y seguridad

Clasificación, Etiquetado y Empaquetado (CLP)



GHS08



GHS07



GHS09

Aviso legal

ATENCIÓN

Indicaciones preventivas

- Se sospecha que daña al feto
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel
- Muy tóxico para los organismos acuáticos
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- Evitar respirar la niebla
- Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- Evitar su liberación al medio ambiente
- Recoger el vertido

Equipo de protección personal

- El aplicador debe utilizar guantes de protección química y mascarilla FFP2 durante la mezcla/carga, así como guantes de protección química y ropa adecuada para el tronco y las piernas durante la aplicación.
- El retorno a la faena en las áreas o cultivos tratados, no debe realizarse durante las primeras 24 horas tras la aplicación, salvo que se trate de actividades que no impliquen el contacto con el cultivo, utilizando en este caso el equipo de protección personal requerido para la aplicación. Durante las siguientes 24 horas se deberá usar ropa y guantes de protección química.
- Para tomate y pepino en invernadero en pulverización con instalación fija automatizada, durante la mezcla y carga se deberán usar guantes de protección química y mascarilla FFP2, y en pulverización con cañon atomizador desde el exterior durante la mezcla y carga se utilizarán guantes de protección química.
- Para tareas superiores a 2 horas en pepino y tomate en invernadero se deberán usar guantes de protección química.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación,
- No entrar en el cultivo hasta que el producto este seco.
- Eviteses el contacto con el follaje húmedo (en cultivos frondosos como tomate y pepino)
- No tratar con este producto en aquellas labores que impliquen actividades mecánicas que puedan derivar en un deterioro de los guantes de protección química del trabajador, durante la reentrada de éste a la finca.
- Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
- Ventilar las zonas / los invernaderos tratados (bien / durante un tiempo especificado / hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

Otras restricciones de uso

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Sugerencia de aplicación

Mezcla y aplicación

Verter la cantidad de producto necesaria para una carga de la máquina de aplicación en el depósito

de la máquina, mediado de agua, con el agitador en funcionamiento, y completar con el agua necesaria. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.

Aplicar en pulverización foliar normal mojando uniformemente la parte aérea del cultivo con un máximo de 2.5 kg/ha, solo en cultivos al aire libre y mediante pulverización con instalación fija automatizada desde el exterior en invernadero.


Contra mildiu los tratamientos deberán iniciarse al comienzo del periodo de crecimiento, de forma preventiva, antes del establecimiento de la enfermedad. Para ello se pueden seguir las recomendaciones de las Estaciones de Avisos.

El intervalo máximo entre las aplicaciones será de 14 días. En condiciones muy favorables al desarrollo del mildiu, reducir el intervalo a 10 días, especialmente en las fases de mayor crecimiento del cultivo.

Si fuera necesario realizar tratamientos adicionales, se utilizarán formulados autorizados con diferente modo de acción.

El intervalo entre la última aplicación de RIDOMIL Gold MZ PEPITE y la del fungicida alternativo será el indicado en la etiqueta de este último, y no deberá ser superior a 10 días.

Medio ambiente

Tipo	Título	Descripción
Protección del medio ambiente	 Organismos acuáticos	Respétese sin tratar una banda de seguridad de 50 m. hasta las masas de agua superficial.

En caso de emergencia

• RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede producir

- Irritación de los ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
- Dermatitis de contacto y sensibilización

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario

- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Datos sobre LMRs

- Dado que estos pueden haber sufrido modificaciones, se recomienda la consulta de la página oficial de la Unión Europea a la que puede acceder a través del siguiente link:
<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=ES>

Pasos para consultar los valores actuales en la base de datos de residuos Europea:

1 Select pesticide residues (5 max)

Search:

Pesticide residues
F
<input type="checkbox"/> Fluometurón
A
<input type="checkbox"/> Abamectina (suma de la avermectina B1a, la avermectina B1b y el isómero delta -8,9 de la avermectina B1a) (F) (R)
<input type="checkbox"/> Acefato
<input type="checkbox"/> Aceite de huesos

2 Select products

Search:

Code	Groups and examples of individual products to which the MRLs apply (a)
<input checked="" type="checkbox"/>	All
<input type="checkbox"/> 0100000	FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA
<input type="checkbox"/> 0110000	Cítricos
<input type="checkbox"/> 0110010	Toronjas o pomelos
<input type="checkbox"/> 0110020	Naranjas
<input type="checkbox"/> 0110030	Limones

3 Select

Current MRLs
 MRLs evolution (max 1 pesticide)

4 Display +

Pesticides selected

Products selected
All

1º. Seleccionar en la columna 1 la sustancia o sustancias del producto del que se quiera consultar los LMRs actuales (mediante la búsqueda desde la celda de "Search" o con la barra de desplazamiento vertical de la columna).

1 Select pesticide residues (5 max)

Search:

Pesticide residues
<input checked="" type="checkbox"/> Fludioxonilo (F) (R)

2 Select products

Search:

Code	Groups and examples of individual products to which the MRLs apply (a)
<input checked="" type="checkbox"/>	All
<input type="checkbox"/> 0100000	FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA
<input type="checkbox"/> 0110000	Cítricos
<input type="checkbox"/> 0110010	Toronjas o pomelos

3 Select

Current MRLs
 MRLs evolution (max 1 pesticide)

4 Display +

Pesticides selected

- Fludioxonilo (F) (R) x
- Difenoconazol x

2º. Seleccionar en la columna 2 los cultivos de interés o dejar señalada la palabra “All” (que viene por defecto) para obtener los valores de la totalidad de los cultivos.

3º. Generar la consulta presionando en “Display”

4º. Consultar online o descargar los datos en un documento Excel, seleccionando “Export to Excel”

Current MRL values

Export to Excel

Search:

Showing 1 to 50 of 378 entries 50 records per page

<< < 1 2 3 4 5 ... 8 > >>

Code number	Products to which MRLs apply (Part A of Annex I to Reg. 396/2005)	Difenoconazol ⓘ	Fludioxonilo (F) (R) ⓘ
0100000	FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA		
0110000	Cítricos	0.6	10.0
0110010	Toronjas o pomelos	0.6	10.0
0110020	Naranjas	0.6	10.0
0110030	Limones	0.6	10.0
0110040	Limas	0.6	10.0
0110050	Mandarinas	0.6	10.0