




Ortiva Top[®]

Fungicida **Top**
para agricultores **Top**



Ortiva Top[®]

syngenta[®]

El fungicida con más amplio espectro
de actividad en cultivos hortícolas

TM






Ortiva Top®

Fungicida de amplio espectro, robusto y eficaz

Características y modo de acción

-  **Ortiva Top®** tiene un **amplio espectro de acción** (mildiu, oídio, alternaria, fulvia, roya y esclerotinia).
-  **Ortiva Top®** tiene **actividad preventiva y curativa**.
-  **Ortiva Top®** se **difunde en el interior de la planta**, actividad traslaminar.
-  **Ortiva Top®** **actúa con dos modos de acción** sobre el mismo hongo, lo que dificulta la selección de cepas resistentes.
-  **Ortiva Top®** es **compatible** con los principales **insectos auxiliares y polinizadores empleados** en los cultivos hortícolas.
-  **Ortiva Top®** **actúa en todo el ciclo del hongo**:
 - > Actividad sobre la germinación y la movilidad de las esporas.
 - > Inhibe crecimiento del micelio, reduce la maduración de las esporas y su virulencia.



 Ortiva Top®				
Fases	Germinación	Infección	Síntomas visibles	Esporulación
				
Acción	Prevención	Curación	Erradicación	Antiesporulación

Ortiva Top[®]

es una combinación única de

- **Azoxistrobin** (200 g/l). Presenta propiedades óptimas de absorción y redistribución en los tejidos vegetales. Es eficaz contra mildius y oídios y presenta un importante efecto sobre otras enfermedades que atacan a los cultivos hortícolas como, por ejemplo, *Alternaria*, *Colletotrichum*, *Sclerotinia*, *Mycosphaerella*, *Cladosporium*, etc.
- **Difenoconazol** (125 g/l). Presenta sistema local con acción preventiva y curativa frente a un gran número de enfermedades como *Alternaria*, *Cercospora*, *Cercosporidium*, *Colletotrichum*, *Mycosphaerella*, *Phoma*, *Ramularia*, *Rhizoctonia*, *Septoria*, *Venturia*, *Erisifales*, etc.



Formulación y envasado

Nº de registro:	25.407
Composición:	Azoxistrobin 200 g/l + Difenoconazol 125 g/l.
Formulación:	Suspensión concentrada (SC).
Presentación:	Envases de 1 y 5 litros.


 Ortiva Top[®]

syngenta[®]

Es un fungicida de alta eficacia y de amplio espectro de acción que mantiene la sanidad de la planta

Eficacia contra oídio (*Leveillula taurica*) en tomate



Ortiva Top presenta un buen control de esta enfermedad.



Testigo: % de superficie foliar atacada

Eficacia contra cladosporiosis (*Fulvia fulva*) en tomate



Ortiva Top ofrece un excelente control para esta enfermedad comenzando los tratamientos de forma preventiva.



Testigo: % de ataque

Eficacia contra alternaria (*Alternaria dauci-Stemphyllium spp.*) en lechuga


Ortiva Top presentó en lechuga, al igual que en otros cultivos, una muy buena eficacia en el control de estas enfermedades.



Testigo: % de superficie foliar atacada

Eficacia contra oídiopsis (*Leveillula sp.*) en alcachofa


Ortiva Top ofrece una notable eficacia en el control de oídiopsis en alcachofa



Testigo: % de superficie foliar atacada

Eficacia contra oídio (*Podosphaera macularis*) en fresa

Ortiva Top, se destaca claramente en el control de oídio en fresa.



Testigo: % de ataque



Recomendaciones de uso

- Aplicar en pulverización foliar, con gota fina sin sobrepasar punto de goteo.
- No mezclar con formulaciones que contengan aceites y no añadir mojantes ni abonos foliares.
- Aplicar preventivamente al inicio de las condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades.
- Utilizarlo en programas alternando con otros fungicidas con diferentes modos de acción.

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Plazo de seguridad	Días de Intervalo	Aplicaciones máximas al año	LMR* (mg/kg)	
						Azoxistrobin	Difenoconazol
Tomate	Oídio, alternaria, mildiu, cladosporiosis	100 ml/hl	3 días	7-10	3 (invernadero y aire libre)	3	2
Berenjena			7 días		3 (invernadero y aire libre)	3	0,4
Pimiento			3 días		2 (invernadero y aire libre)	3	0,5
Alcachofa			Oídio		7 días	3 (aire libre)	5
Lechuga	Alternaria, esclerotinia, mildiu		7 días		3 (aire libre)	3	3
Fresa	Oídio		3 días		3 (aire libre)	10	0,4
Judía Verde	Oídio, roya		7 días	10-12	2 (aire libre)	3	1

Leer atentamente la etiqueta antes de aplicar el producto.

Selectividad y Mezclas

Ortiva Top es bien tolerado por los cultivos en los que está registrado y utilizado según las recomendaciones de etiqueta. Así lo demuestran todos los ensayos llevados a cabo en España, Portugal e Italia.

Ortiva Top como precaución, no debe mezclarse con productos que contengan aceites en su composición y aquellos que pueden aumentar la absorción del producto como mojantes adherentes y aminoácidos. Con los demás productos ensayados, presenta una buena compatibilidad, en caso de duda consultar Servicio Técnico de Syngenta o hacer un test previo observando la reacción del cultivo los días posteriores a la aplicación.

* Consultar página para asegurarse de que los LMR están actualizados. http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage&CFID=584690&CFTOKEN=84098623&jsessionid=090468eb62fe315bcaed7f210385e5e66e65TR

