Soluciones **Syngenta** para uva de mesa

NOVEDADES 2022 PRODUCTOS

syngenta®

® 2022 Syngenta. Todos los derechos reservados. ™ y ® son marcas comerciales del Grupo Syngenta.

Use los productos fitosanitarios de manera segura.
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

®

fungicida

Recatium®

NUEVO

Recatium® es un fungicida sistémico de ultima generación para el control del oídio de la vid, está compuesto por Espiroxamida (500g/l) y con una formulación emulsionable concentrada de gran calidad.

La espiroxamina es una molécula, única representante de su género, de la familia de las espiroketalamidas, es una amina (morfolina) que interfiere en la biosíntesis del ergosterol, está clasificada en el grupo G2 del FRAC.

Características y beneficios

- Antioídio preventivo y con acción curativa.
- Modo de acción único - Ideal para la gestión de resistencias.
- Fungicida sistémico, que protege los nuevos crecimientos.
- Eficaz a bajas temperaturas.
- Rápida resistencia a lluvia: 100% una vez seco.
- No afecta a la fauna auxiliar (artrópodos beneficiosos).
- No afecta a la vinificación.
- Niveles de residuos definidos a nivel mundial.

fungicida

Ampexio® C

NUEVO

Ampexio®C es un fungicida con formulación granulado **Pepite®**, a base de mandipropamida con cobre, para el control de mildiu de la viña en los últimos tratamientos del ciclo.

Características y beneficios

- Fungicida de acción protectora del Oxicloruro de cobre y traslaminar de la Mandipropamida.
- Con acción preventiva y antiesporulante.
- Buena resistencia al lavado por lluvia.
- Sin problemas de resistencias cruzadas con otros productos dada la acción multisitio del Cobre.
- Formulado como **WG Pepite®**.
- Sin interferencias en la fermentación.

fungicida

Ridomil®25

NUEVO

Ridomil®25 El fungicida, antimildiu, del grupo de la phenilamidas, sistémico, a base de Metalaxil, con acción preventiva y curativa en múltiples cultivos.

Ridomil®25 se absorbe por las hojas, tallos y raíces de las plantas, se mueve en el interior de los tejidos vegetales tratados de forma homogénea y entra e las células fúngicas inhibiendo la síntesis de las proteínas del hongo, el crecimiento del micelio, la formación de esporas y una acción monositio en los haustorios.

Características y beneficios

- Acción sistémica (principalmente hacia arriba).
- Rápida absorción (30 min).
- Protección total de la vegetación existente y nueva.
- Acciones protectoras, curativas y erradicantes (fungistático).
- Independiente de las condiciones climáticas.
- Persistencia (14 días).
- Alta eficacia y amplio espectro.

fungicida

Cidely®

Cidely® es un fungicida muy activo para el **control de oídio** en uva de mesa.

Cidely® se compone de Ciflufenamida, una novedosa materia activa muy activa en una amplia gama de oídios, con acción preventiva y prolongada protección. Presenta un **movimiento translaminar, vertical y lateral** dentro de la planta, así como un **efecto vapor** de larga duración sobre la superficie y el interior de la planta.

Características y beneficios

- Protección interna y externa de toda la planta.
- Resistencia al lavado.
- Excelente eficacia.
- Adaptado a los programas de producción integrada.

fungicida

Taegro®

Taegro® Es un biofungicida de origen natural (*Bacillus amyloliquefaciens* cepa FZB24 13% WP), para el control preventivo de oídio y botritis en uva de mesa. Su empleo dentro de una estrategia de manejo integrado de enfermedades permite cumplir los requisitos de la cadena agroalimentaria maximizando los rendimientos.

Características y beneficios

- Triple modo de acción.
  1. Competencia con los patógenos sobre la superficie de la hoja.
  2. Liberación de metabolitos, que inhiben el crecimiento de los patógenos.
  3. Inducción de los mecanismos de defensa naturales de la planta (SAR).
- Compatible con fauna auxiliar, programas de cultivo ecológico y convencional.
- Sin problemas de residuos.
- Flexibilidad de uso, buen comportamiento en un amplio rango de pH y temperaturas.
- Bajo riesgo de aparición de resistencias.

fungicida

Geoxe® 50 WG

Las podredumbres pueden producir importantes pérdidas durante el ciclo del cultivo y su conservación hasta la comercialización, por lo que pueden afectar, si no se tiene un buen control, a la cantidad y la calidad de la cosecha.

Por ello, **Syngenta** ha desarrollado **Geoxe® 50 WG**, un fungicida de **alta eficacia** y con un **amplio espectro** de acción **frente a las podredumbres** que afectan tanto a uva de mesa como de vinificación.

Características y beneficios

- Alta eficacia y de amplio espectro.
- Protege la cosecha y mejora la conservación.
- Modo de acción único.
- Poco susceptible a generar resistencias.
- Buen perfil para la exportación.

insecticida

KarateTrap™

Karate Trap® es una trampa de captura masiva de Ceratitis con atrayente y Lambda Cihalotrin como insecticida de contacto (atracción y muerte).

Características y beneficios

- Amplio periodo de protección.
- Ideal para el manejo de resistencias.
- Fácil colocación.
- Selectivo con fauna auxiliar e insectos no diana.

Modo de uso

- Colocar entre 90 y 100 días previos a la recolección.
- Colocar en la cara sur a una altura entre 1,5 y 2 m.
- Las trampas deben colocarse 45 días antes de la maduración del fruto.
- Dosis: entre 50-80 uds por hectárea, dependiendo de la incidencia, distribuidas al tresbolillo.

insecticida

Costar®

Costar® es un potente **insecticida biológico**, especialmente indicado para su empleo en programas de lucha integrada y biológica, contiene una alta riqueza en cristales proteicos de *Bacillus thuringiensis* (Berliner), var. Kurstaki, que se trasforman en una gran cantidad de toxinas activas en el aparato digestivo de las larvas de lepidópteros. Es selectivo y actúa por ingestión, sobre larvas de los primeros estadios de desarrollo.

Características y beneficios

- **Triple potencia insecticida** contra lepidópteros respecto a otros Bt´s, gracias a la alta concentración de cristales proteicos.
- Selectivo para todo tipo de insectos auxiliares al ser totalmente específico contra lepidópteros.
- Sin residuos y sin plazo de seguridad para la recolección.
- Excelente para utilizarlo en programas anti-resistencias.
- Es el complemento ideal para las áreas donde se utiliza la confusión sexual en los momentos de mayor riesgo y cercano al embolsado o a cosecha.
- Fácil de usar, tan solo hay que aplicar cada 7 días (máximo 4 aplicaciones) durante la eclosión de los huevos de la generación a controlar y mojar bien los racimos. Siguiendo estas recomendaciones tiene una buena eficacia contra Lobesia.

Estrategia de tratamientos Syngenta en uva de mesa



Esta es una lista de soluciones elaborada por Syngenta de forma general para uva de mesa, consulte con su representante de Syngenta para un programa de aplicación personalizado.

Catálogo Syngenta para uva de mesa

	Producto	Plagas / Enfermedades	Dosis	Nº máximo de aplicaciones	Plazo de Seguridad	LMR (mg/kg)
Fungicidas	Ampexio®	Mildiu	0,5 kg/ha	3 (intervalo de 8 días)	21 días	Mandipropamida: 2 Zoxamida: 5
	Ampexio® C	Mildiu	5 kg/ha	1	21 días	Mandipropamida: 2 Cobre: 50
	Cidely®	Oídio	0,5 l/ha	2 (intervalo de 14 días)	21 días	0,15
	Cuprantol Duo (CAAE)	Mildiu y Black-rot	1,25-2,5 kg/ha	1	21 días	50
	Dynali®	Oídio, Black-rot y Brenner	50-65 ml/hl (máximo 0,65 l/ha)	2 (intervalo de 10 días)	21 días	Difenoconazol: 3 Ciflufenamida: 0,15
	Geoxe® 50 WG	*Botrytis cinerea*	0,1 kg/hl (máximo 1 kg/ha)	2 (intervalo de 21 días)	7 días	5
	Quadris®	Mildiu, Oídio y Black-Rot	85-200 ml/hl (máximo 1 l/ha)	3 (intervalo de 10-14 días)	21 días	3
	Ridomil® 25	Mildiu	0,8 Kg/ha	2 (intervalo de 21 días)	14 días	2
	Revus®	Mildiu	0,4-0,6 l/ha	4 (intervalo de 7-10 días)	21 días	2
	Recatium®	Oídio	0,6 l/ha	2 (intervalo de 10-14 días)	35 días	1
	Ridomil Gold® Combi	Mildiu	200-250 g/hl (máximo 2,5 kg/ha)	4 (intervalo de 10-14 días)	NP	Mancozeb : 5 Metalaxil-M: 2
	Switch®	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*) y *Aspergillus sp*.	0,6-1 kg/ha	2 (intervalo de 21 días)	7 días	Ciprodinil: 3 Fludioxonil: 5
	Taegro® (CAAE)	Oídio y Podredumbre gris	0,185-0,37 kg/ha	1-10 (intervalo de 7 días)	1 día	NP
	Thiovit Jet®	Oídio, araña roja y eriófidos	200-500 g/hl (máximo 5 kg/ha)	4 (intervalo de 10 días)	NP	NP
	Topas® 200 EW	Oídio	15 ml/hl (máximo 0,15 l/ha)	3 (intervalo de 7 días)	14 días	0,4
Insecticidas	Agrimec® Vertimec®	Ácaros	50-75 ml/hl (máximo 0,75 l/ha)	2 (intervalo de 21 días)	28 días	0,01*
	Costar® (CAAE)	Lobesia	50-100 g/hl (máximo 1 kg/ha)	4 (intervalo de 7 días)	NP	NP
	Evure	Empoasca y Flavescencia dorada	20 cc/hl (máx. 40 cc/ha)	1	28 días	1
	Karate Trap™ (CAAE)	Ceratitis	50-80 uds/ha	Colocar 45 días antes de maduración	NP	NP
	Karate Zeon+® 1.5 CS	Polillas de racimo, Pulgones, *Scaphoideus titanus, Philaenus spumarius* y *Neophilaenus campestris*	65 - 130 cc/hl 165 cc/hl (*Scaphoideus Titanus*) (máximo 1,3 l/ha)	1	7 días	0,08
	Zeldox®	Ácaros tetraniquidos	20 ml/hl	1	21 días	1
Herbicidas	Cinder Caps	Malas hierbas anuales	3 l/ha	1	NP	0,05*
	Niro	Malas hierbas anuales	3-4 l/ha	1	14 días	Diflufenican: 0,01* Glifosato: 0,5
	Terafit®	Ciperáceas, Dicotiledóneas y Gramíneas	100-200 g/ha	1	NP	0,01*
	Touchdown Premium®	Malas hierbas anuales y vivaces	2-5 l/ha (anuales) 2-7,5 l/ha (vivaces)	-	NP	0,5

Consulte la Guía GIP para una gestión sostenible de uva de mesa: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/GUIAUVADEMESA%20(2)_tcm30-57936.pdf

NP: No procede. * Indica el límite de detección.

syngenta®

Syngenta España S.A.U.
C/ Ribera del Loira 8-10
28042 Madrid
www.syngenta.es

VIDPU001-Abr22