

Protege tu cosecha



con confianza

...**con** una sola materia activa,
con diferente modo de acción, **con** gran eficacia
y **fiabilidad**. Fungicida para el control de oídio.

 **Cidely**[®]

syngenta[®]


© 2019 Syngenta. Todos los derechos reservados. [™] y [®] son marcas comerciales del Grupo Syngenta.

Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

®



Protege tu cosecha **con** confianza



Nuevo fungicida de **Syngenta** para el control de oídio en frutales de hueso.

Cidely se compone de una sola materia activa:


- **Ciflufenamid** es muy activo en una amplia gama de oídios, con acción preventiva y prolongada protección. Presenta un movimiento translaminar, vertical y lateral, así como un efecto vapor de larga duración sobre la superficie y el interior de la planta.



Ventajas

- Protección interna y externa de toda la planta.
- Resistencia al lavado.
- Excelente eficacia.
- Adaptado a los programas de producción integrada.

Modo de acción y biocinética



Cidely presenta movimiento traslaminar vertical y lateral, complementado por una importante acción vapor.


Cidely presenta elevada resistencia al lavado.

Ciclo del oídio y acción de Ciflufenamid

Cidely presenta una fuerte acción preventiva y actividad curativa.

Cidely actúa principalmente impidiendo:

- La formación de haustorios.
- El crecimiento del micelio.
- Y la producción de inóculo.



Cidely, al llegar a todas las partes de la planta, permite un alto nivel de eficacia en el control del oídio en frutales de hueso

Modo de empleo

Las aplicaciones deberán iniciarse de manera preventiva cuando se den las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. El producto puede aplicarse desde que las primeras hojas alcanzan el tamaño varietal final hasta que los frutos han alcanzado la madurez para recolección (BBCH 19-87).

Se aplicará en pulverización foliar normal, manual o con tractor, a una dosis de 0,5 l/ha, con un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha, de manera que se moje uniformemente todo el cultivo.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones a un intervalo mínimo de 7 días.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad	LMR (mg/kg) en UE
Frutal de hueso (incluido melocotonero, nectarino y albaricoquero)	Oídio	0,5 l/ha	14 días	0,06

⁽¹⁾ Consultar la pagina de la UE: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/ y la pagina de los EEUU: <https://www.globalmri.com/> para asegurarse de que los LMR están actualizados.

Nº registro	25.480
Composición	5,13% de Ciflufenamid
Formulación	EW (emulsión de aceite en agua)
Presentación	Envases de 1 l





Estrategia frente a oídio en frutales de hueso



Compatibilidad con polinizadores y beneficiosos

Cidely es compatible con los principales insectos auxiliares y polinizadores empleados en el cultivo de frutales de hueso.

Un planeta,
seis compromisos
para 2020

the
good
growth
plan



Hacer
cultivos más
eficientes



Recuperar
más tierras
para cultivos



Ayudar a que
la biodiversidad
florezca



Fortalecer a los
pequeños
productores



Ayudar a las
personas a
mantenerse seguras



Cuidar
de cada
trabajador



www.goodgrowthplan.com



Syngenta España S.A.U.
C/ Ribera del Loira 8-10. 28042 Madrid
www.syngenta.es