









## Registro de Minecto™ Alpha

Cultivo	Método de aplicación	Plagas	Dosis	PS días	Acibenzolar -S-methyl (ppm)	Ciantraniliprol (ppm)
Tomate Invernadero	Aplicación foliar	Trips	125 ml/hl (máximo 1.2 l/ha)	3	0,3	1
		Mosca blanca Lepidópteros* Tuta Absoluta Minadores	100 ml/hl (máximo 1.2 l/ha)			
	Riego por goteo	Trips, Mosca blanca Lepidópteros* Tuta Absoluta Minadores	1 l/ha	14		
Pimiento Invernadero	Riego por goteo	Trips, Mosca blanca Lepidópteros* Minadores	1 l/ha	14	0,01	1,5
Lechuga Aire libre	Aplicación foliar	Trips	1 l/ha-1,25 l/ha	3	0,4	5
		Spodoptera	0,75 l/ha-1 l/ha			
	Riego por goteo	Trips	1 l/ha	14		
		Spodoptera	0,75 l/ha			

ENVASE: 1 y 5 L.


\* Eficaz contra *Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis* y *Heliothis armigera*.

Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga ciantraniliprol más de una vez cada dos años.





Para el resto de medidas de mitigación medioambientales, consultar la etiqueta.

### Recomendaciones específicas para prevenir la aparición de resistencias a diamidas

- No utilizar exclusivamente grupo 28 (Diamidas) a lo largo de un ciclo de cultivo para una plaga con más de una generación.
- A efectos prácticos se considera que una ventana son 30 días y en este periodo se pueden dar de 1 a 2 tratamientos con Diamidas.
- En ciclos cortos de cultivo (<50 días) se considera un ciclo como una ventana, en ciclos de cultivo consecutivos se irán rotando ventanas con diferente modo de acción.
- En general, y dependiendo de los cultivos, se define un máximo de 2 periodos de aplicación al año, con un máximo de 2 aplicaciones por periodo de aplicación.
- Deberán transcurrir un mínimo de 60 días entre periodos de aplicación con insecticidas de este grupo para evitar exponerlos a generaciones consecutivas de plaga.
- El número máximo de aplicaciones no deberán representar más del 50% de las aplicaciones insecticidas contra la misma plaga.



## PASADO. PRESENTE. MINECTO.

-  Control multiplaga con actividad prolongada.
-  Protección adicional demostrada frente a virus (TSWV y TYLCV).
-  Método de aplicación versátil: foliar y riego.
-  Compatible con insectos beneficiosos.



Syngenta España S.A.U.  
C/ Ribera del Loira 8-10  
28042 Madrid  
[www.syngenta.es](http://www.syngenta.es)



<https://www.syngenta.es/good-growth-plan>