

Bizantino

(130562)

El tomate por excelencia



syngenta[®]

Más información en:
www.syngenta.es

®

Características del producto

- Planta muy sana, oscura, muy aireada. Vigor medio y entrenado medio-largo.
- Buena floración y cuaje con calor.
- Fruta de calibre G-GG, con cuello blanco y con posibilidad de recolección en pintón, madurando y en rojo.
- Muy buena precocidad en la recolección y velocidad de maduración.
- Buen comportamiento frente a rajado y a microcracking.
- Los frutos de Bizantino destacan por su buen sabor.
- Muy buena firmeza y conservación.
- Alta producción comercial.

Resistencia alta HR: For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E

Resistencia Intermedia IR: TYLCV / Mi / Ma / Mj

Fechas de plantación en zona de Almería, costa de Granada y Málaga

Plantaciones de primavera

Enero				Febrero				Marzo			
1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.

Significado de términos

RESISTENCIA: La capacidad de una variedad para restringir el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad específica y el daño que éstas causan cuando se comparan con variedades sensibles, bajo condiciones medioambientales y presiones similares deplaga o enfermedad. Las variedades resistentes pueden mostrar algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad. Se definen 2 niveles de resistencia:

• **RESISTENCIA ALTA (HR):** Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o plaga, cuando se compara con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.

• **RESISTENCIA INTERMEDIA (IR):** Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas en comparación con variedades altamente resistentes. Las variedades con resistencia intermedia mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menores que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión similares de la plaga o enfermedad.

Plantaciones de verano

Julio				Agosto			
1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.



Significado de abreviaturas

For : Fusarium oxysporum f.sp. radicum-lycopersici
ToMV0-2 : Virus del mosaico del tomate razas 0, 1, 1.2, 2
TMV:0 : Tobacco Mosaic Virus (Mosaico del Tabaco), raza 0
Fol: 0-1 (US1-2) : Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raza 1-2
Vd : Verticillium dahliae
Va : Verticillium albo-atrum
Ff: A-E : Fulvia fulva group A - E
TYLCV : Resistencia intermedia al virus de la cuchara del tomate
Ma, Mi, Mj : Resistencia intermedia a Nematodos (Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne Javanica)



© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados.
 TM o ® son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta